

Landes humides atlantiques tempérées à *Erica ciliaris* et *Erica tetralix* *

Natura 2000 : 4020
Corine : 31.12

Déclinaison locale de l'habitat	Lande hygrophile	Espèces végétales caractéristiques Bruyère à quatre angles - Choin noirâtre - Sphaignes
Unités supérieures	<i>Ericion tetralicis</i>	
Associations végétales	<i>Erico scopariae</i> – <i>Ericetum tetralicis</i>	
Niveau d'enjeu Docob	1	
Description sommaire		
<p>Landes dominées par les chaméphytes (bruyères, callune...) et des nanophanérophytes (Ajoncs). La bruyère à quatre angles caractérise les pôles les plus humides, et la bruyère ciliée rappelle le caractère océanique tempéré. La Molinie est plus ou moins abondante, mais peut parfois conférer une physionomie herbeuse. La détermination de l'habitat typique pose des problèmes, mais les landes sont toujours en mosaïques, avec des pôles plus humides dans les parties basses (landes, pelouses, gazons), et des zones mésohygrophiles sur les hauteurs (landes à Brandes)</p>		
Exigences écologiques		
<p>☺ Éléments favorables</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ absence de fossés à proximité ➢ maintien d'un niveau de nappe haut <p>☹* Éléments défavorables</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ drainage ➢ abaissement de la nappe ➢ fermeture du milieu (souvent conséquence des deux précédents) ➢ cultures (agricoles, forestières, autres...) 		
Importance patrimoniale		
<p>Il s'agit d'un habitat devenu rare au niveau national et en Aquitaine, du fait notamment des boisements en Pins maritimes, et de l'agriculture. Il abrite un grand nombre d'espèces patrimoniales (Gentiane pneumonanthe et Azuré des mouillères, Rossolis, Lycopode inondé, Grassettes du Portugal...) et constitue un biotope exploité par le Courlis cendré, les busards, la Fauvette pitchou...</p>		
Préconisations de gestion		Etat de conservation sur le site
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pas mise en culture ➢ recherche d'un relèvement du niveau moyen de la nappe ➢ gestion extensive notamment des actions de fauche ou de brûlis 		mauvais, du fait que l'habitat observé correspond à un stade dégradé de l'habitat type.
Aspect de l'habitat		Représentativité (si connue)
	<p><i>Facès de lande hygrophile, où l'on peut voir une Gentiane pneumonanthe (fleur bleue), de l'Ajonc nain (fleurs jaunes), des Bruyères à quatre angles, de la Molinie...</i></p>	1800 ha
		Compléments
		<p>L'évolution des landes sur le site, et en l'absence d'actions d'entretien spécifiques (reproduisant les modes de gestion pastoraux d'antan), se traduit sur le long terme par une fermeture avec apparition de la pinède naturelle. La détermination de cet habitat reste à établir de façon plus formelle</p>